

## Legende

- Mesophile Buchen(misch)wälder
- 1 1.1-1.3 Mesophile Buchen(misch)wälder
- Komplexe aus mesophilen und bodensauren Buchen(misch)wäldern
- 2 1.1.2/2.1.4 Vogtländischer Komplex mesophiler und bodensaurer Buchen(misch)wälder
- 3 2.1.6/2.1.8/1.1.1 Oberlausitzer Komplex bodensaurer und mesophiler Buchen(misch)wälder
- Bodensaure Buchen(misch)wälder
- ziemlich reich bis mäßig nährstoffversorgter Standorte
- 4 2.1.8 Flattergras-Eichen-Buchenwälder
- 5 2.1.2/2.1.8/2.1.6 (Hoch)kolliner Eichen-Buchenwald mit Flattergras- und Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 6 2.1.1/2.1.8 Submontaner Eichen-Buchenwald mit Flattergras-Eichen-Buchenwald
- 7 2.1.1/2.1.8/2.1.6 Submontaner Eichen-Buchenwald mit Flattergras- und Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 8 2.3.1/2.3.5 Montaner (Tannen-Fichten-)Buchenwald mit Flattergras-(Tannen-Fichten-)Buchenwald
- 9 2.1.6/1.1 Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald mit Waldmeister-Buchenwald
- mäßig nährstoffversorgter Standorte
- 10 2.1.3 Planarer Eichen-Buchenwald der Dübener Heide
- 11 2.1.3/8.3 Planarer Eichen-Buchenwald der Dahleiner Heide mit Erlen-Eschen-Bach- und Quellwäldern
- 12 2.1.2 (Hoch)kolliner Eichen-Buchenwald
- 13 2.1.2/2.1.6 (Hoch)kolliner Eichen-Buchenwald mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 14 2.1.1 Submontaner Eichen-Buchenwald
- 15 2.1.1/2.1.6 Submontaner Eichen-Buchenwald mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 16 2.3.1/6.1 Montaner Hainsimsen-(Tannen-Fichten-)Buchenwald mit vernähten Wollreitgras-Fichtenwäldern
- 17 2.1.6 Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- ziemlich nährstoffarmer bis mäßig nährstoffversorgter Standorte
- 18 2.1.5/2.1 Heidelbeer-Eichen-Buchenwald und Typischer Eichen-Buchenwald
- 19 2.1.5/5.2/5.3 Heidelbeer-Eichen-Buchenwald der westelbischen Sandsteingebiete mit bodensauren Eichen(misch)wäldern
- 20 2.1.5/7.1.3/2.3.3 Heidelbeer-Eichen-Buchenwald der ostelbischen Sandsteingebiete mit Kiefern-Felswald und Farn-(Tannen-Fichten-)Buchenwald
- 21 2.1.5/2.1.6 Heidelbeer-Eichen-Buchenwald mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 22 2.1.2.1.5/8.3 Kirchberger Komplex von Typischem Eichen-Buchenwald mit Heidelbeer-Eichen-Buchenwald und Erlen-Eschen-Bach- und Quellwäldern
- 23 2.3.2/6.1 Heidelbeer-(Tannen-Fichten-)Buchenwald mit vernähten Wollreitgras-Fichtenwäldern
- 24 2.3.2/7.1.3 Heidelbeer-(Tannen-Fichten-)Buchenwald des Zittauer Gebirges mit Kiefern-Felswald
- 25 2.1.4/2.1.6 Vogtländischer Eichen-Buchenwald mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 26 2.3.4 Vogtländischer (Tannen-Fichten-)Buchenwald
- 27 2.4 Schattenblümchen-Buchenwald
- 28 2.5 Wollreitgras-Fichten-Buchenwald
- Komplexe und Übergänge aus Linden-Hainbuchen-Eichenwäldern und bodensauren Buchen(misch)wäldern
- 29 2.1.8.1 Linden-Hainbuchen-Stieleichenwälder mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald
- 30 2.1.8.2 Linden-Hainbuchen-Traubeneichenwälder mit Typischem Eichen-Buchenwald
- Linden-Hainbuchen-Traubeneichenwälder grundwasserferner Standorte
- nährstoffreicher Schwarzerden
- 31 3.2.4 Mitteldeutscher Hainbuchen-Traubeneichenwald
- mäßig bis reich nährstoffversorgter Standorte
- 32 3.2.1 Elsbeeren-Hainbuchen-Traubeneichenwald
- 33 3.2.2/3.1.1 Typischer Hainbuchen-Traubeneichenwald mit Waldziest-Hainbuchen-Stieleichenwald
- 34 3.2.5 Ostsächsischer Hainbuchen-Traubeneichenwald
- 35 3.2.2/3.2.3 Typischer Hainbuchen-Traubeneichenwald im Komplex mit Grasreichem Hainbuchen-Traubeneichenwald
- 36 3.2.5/3.2.3 Ostsächsischer Hainbuchen-Traubeneichenwald im Komplex mit Grasreichem Hainbuchen-Traubeneichenwald
- ausschließlich mäßig nährstoffversorgter Standorte
- 37 3.2.3 Grasreicher Hainbuchen-Traubeneichenwald
- Linden-Hainbuchen-Stieleichenwälder grund- oder stauwasserbeeinflusster Standorte
- 38 3.1.2 Zittergrasseggen-Hainbuchen-Stieleichenwald
- 39 3.1.2/8.2 Zittergrasseggen-Hainbuchen-Stieleichenwald im Übergang zu Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald
- 40 3.1.3 Pfeifengras-Hainbuchen-Stieleichenwald
- Bodensaure Eichen(misch)wälder
- 41 5.1 Buchen-Eichenwald
- 42 5.2 (Kiefern-)Birken-Stieleichenwald
- 43 5.2.2.1 Komplex von vernähten (Kiefern-)Birken-Stieleichenwäldern und von Eichen-Buchenwäldern
- 44 5.3.1 Typischer Kiefern-Eichenwald
- 45 5.3.2 Waldreitgras-Kiefern-Traubeneichenwald
- Fichtenwälder, Kiefern- und Tannen-Fichtenwälder
- 46 6.1.1-3 Unvernähte hochmontane Wollreitgras-Fichtenwälder
- 47 6.1.5-7 Vernähte montan-hochmontane Wollreitgras-Fichtenwälder
- 48 6.1.9/5.2.3 Planarer Kiefern-Fichtenwald und Fichten-(Kiefern-)Stieleichenwald
- 49 6.2 (Tannen-Kiefern-)Fichtenwald
- Zwergstrauch- oder moosreiche Kiefernwälder
- 50 7.1.1 Typischer Zwergstrauch-Kiefernwald
- 51 7.1.5.2 Komplex von Typischem Zwergstrauch-Kiefernwald der östlichen Muskauer Heide mit Pfeifengras-Kiefernwald und (Kiefern-)Birken-Stieleichenwald
- 52 7.1.1/5.3.1 Komplex von Typischem Zwergstrauch-Kiefernwald und Typischem Kiefern-Eichenwald
- Auen- und Niederungswälder (überwiegend) mineralischer Naßstandorte
- Erlen-Eschen-Auen, Quell- und Niederungswälder
- 53 8.1/10.2 Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald und Bruchweiden-Auengebüsch und -wald
- 54 8.2 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald
- 55 8.2.5.2 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald im Übergang zu nassen (Kiefern-)Birken-Stieleichenwäldern
- 56 8.3/2.3 Erlen-Eschen-Bach- und Quellwälder mit Hainsimsen-(Fichten-Tannen-)Buchenwald
- Hart- und Weichholz-Auenwälder
- 57 9.1/10.1 Eichen-Ulmen-Auenwald mit Silberweiden-Auenwald
- 58 9.1.8.1.2 Eichen-Ulmen-Auenwald im Übergang zu Zittergrasseggen-Hainbuchen-Stieleichenwald
- Bruch- und Moorwälder (überwiegend) organischer Naßstandorte
- 59 11 Komplex planarer Erlen-Bruchwälder
- 60 11/12 Komplex montan-hochmontaner Bruch- und Moorwälder sowie offener Zwischenmoore
- nährstoffarmer und ziemlich nährstoffarmer Standorte
- 61 12.2 Planare Wäldkiefern-Moorgehölze und -Moorwälder
- 62 12/6.1.5 Komplex montan-hochmontaner Moorwälder und Torfmoos-Fichtenwälder
- Gewässer und natürliches Offenland
- 63 0.1.1 Offene Wasserflächen
- 64 0.2.1/12 Komplex planarer offener Zwischenmoore und Moorwälder
- Künstliche Ökosysteme
- 65 16.1 Bergbauggebiete und Deponien
- 66 16.2 Dichte Siedlungsgebiete